

TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX®)




O que é toxina botulínica tipo A?

É uma substância de origem biológica obtida a partir da cultura da bactéria *Clostridium botulinum*

Embora seja obtido de uma bactéria e seja uma toxina, não é um veneno. Seu uso é comprovadamente seguro e eficaz!

É uma substância amplamente utilizada na Medicina desde os anos 80 para indicações terapêuticas e

Conheça o longo histórico da toxina botulínica tipo A



Como atua a toxina botulínica Tipo A?

A toxina botulínica tipo A **NÃO PARALISA** o músculo, mas **RELAXA** a musculatura onde é aplicada;

- Uma vez injetado no músculo, atua bloqueando temporariamente a liberação de acetilcolina, uma substância que estimula o músculo a contrair-se, resultando no relaxamento do músculo tratado;
- O grau de relaxamento pode ser em maior ou menor intensidade dependendo da dosagem do tratamento e dos objetivos estabelecidos entre médico e paciente;
- Os resultados podem ser bem naturais ou mais artificiais requerendo do médico tratamentos individualizados para cada caso;
- Não tem a capacidade de aumentar volume.

Como é a aplicação da toxina botulínica tipo A?

- É um procedimento médico que requer conhecimento e treinamento adequado
- A aplicação é realizada através de pequenas injeções com agulhas bem finas diretamente no músculo responsável pela formação da ruga que se deseja tratar
- A aplicação é rápida e praticamente indolor



Como é o efeito da toxina botulínica tipo A?

- Os efeitos iniciais são observados em aproximadamente 48-72hs, podendo variar de paciente para paciente
- Efeito máximo em aproximadamente 15-20 dias
- Duração total do efeito é variável de acordo com o metabolismo e hábitos de cada paciente, bem como dose e plano de aplicação, sendo de aproximadamente 4-6 meses
- A perda do efeito ocorre lentamente, com retorno gradual da atividade muscular
- O retorno da atividade muscular pode variar entre as áreas tratadas

Como é o efeito da toxina botulínica tipo A?



Dicas de sucesso para o uso da toxina botulínica tipo A



- Aplicação realizada somente por médicos
- Conhecimento sobre a anatomia facial
- Comunicação com os pacientes para esclarecimento das expectativas e dúvidas, bem como estabelecimento dos objetivos do tratamento
- Individualização do tratamento
- Registro fotográfico para mensuração do resultado

Contra Indicações

- ❑ Alergia conhecida a qualquer componente da formulação
- ❑ Infecção ou inflamação no local que será tratado
- ❑ Mulheres grávidas ou em fase de amamentação
- ❑ Distúrbios da junção neuromuscular
- ❑ Distúrbios de debilidade muscular
- ❑ Coagulopatias
- ❑ Em tratamento com antibióticos aminoglicosídeos



Principais áreas de tratamento da toxina botulínica tipo A?



Hiperidrose (produção excessiva de suor)

A toxina botulínica tipo A também pode ser utilizada para o tratamento da Hiperidrose. As áreas mais acometidas pela Hiperidrose são: axilas, palma das mãos e planta dos pés.



PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS
AGENDE UMA AVALIAÇÃO